



DI EP Lazio

Dipartimento di Epidemiologia
del Servizio Sanitario Regionale
Regione Lazio



SISTEMA SANITARIO REGIONALE
**ASL
ROMA E**



**REGIONE
LAZIO**

DONNE VITTIMA DI VIOLENZA:

VALUTAZIONE DEI PROFILI DI RISCHIO ATTRAVERSO IL RICORSO AL PRONTO SOCCORSO

Lapucci E., Farchi S., Cesaroni G., Davoli M., Michelozzi P.

*XXXIX convegno AIE
Novembre 2015*

Violenza di genere: Rilevanza del fenomeno

Un terzo delle donne dichiara di essere stata vittima di violenza nel corso della vita (EU 33%* - Italia 31,5%)**

- ❖ Impatto sulla salute fisica, mentale e materno-infantile (OMS, 2013)
- ❖ Aumenta la consapevolezza delle donne e il ricorso alle strutture di assistenza (dal 2,4% nel 2006 al 4,9% nel 2014)

Violenza domestica

- ❖ Nel 65,2% dei casi i figli hanno assistito alla violenza, in aumento rispetto al 2006 (60,3%)
- ❖ La violenza è nella maggioranza dei casi ripetuta (67,4% dei casi di violenza)


Fonti

* Indagine europea sulla violenza di genere, anno 2012


** Indagine Istat sulla violenza di genere, anno 2014

Classificazione dell'atto violento

1- Relazione
Vittima
aggressore



2- Natura
dell'atto
violento



Krugh et al., The world report on violence and health, 2002

Accessi in PS per trauma classificato come «aggressione»

Accessi in PS per aggressione

- ❖ Circa 6 casi ogni 1000 donne residenti nel Lazio con accesso in PS nel biennio 2013-2014
- ❖ Mediamente più giovani (41 Vs 50 anni) e straniere (26% Vs 16%)
- ❖ Nel 1,3% delle aggressioni era confermata la diagnosi di abuso o maltrattamento (ICD9-CM 995.8)
- ❖ Nei tre anni precedenti ricorso maggiore (4,0 accessi per donna vs media generale 2,2) e più frequentemente per:
 - ✓ Contusioni (ICD9-CM 920-924: 11%);
 - ✓ Dolori addominali (ICD9-CM 789: 7%);
 - ✓ Disturbi nevrotici (ICD9-CM 300-316: 5%);
 - ✓ Malattie del sistema nervoso (ICD9-CM 320-389: 4%);

Accessi in PS per aggressione: Studio di coorte



Obiettivo: Caratterizzare le potenziali vittime di violenza domestica attraverso gli accessi ripetuti in PS per aggressione

Fonti: Sistema informativo delle emergenze del Lazio, anni 2002-2014
RoLS - Studio Longitudinale di Roma (*Cesaroni et al, 2010.*)

Coorte: Donne in età 15 anni e più che hanno subito un **primo episodio di aggressione** nel periodo 2008-2012 e incluse nel RoLS



primo accesso in PS per aggressione non preceduto da altri episodi di aggressione nei cinque anni precedenti

Follow-up: a 24 mesi successivi alla data della prima aggressione

Esito: Accesso ripetuto in PS per causa aggressione

Fattori di rischio: Caratteristiche socio-demografiche (età; stato civile; titolo di studio; occupazione; SES)

Accessi in PS per aggressione: Studio di coorte

51.520 Accessi in PS per
aggressione Lazio, anno 2008-
2012



36.817 primo episodio di
Aggressione



8.495 Donne con una prima
aggressione e incluse nello Studio
Longitudinale di Roma



3.504 (41%) senza accessi in PS
nei 24 mesi successivi

979 (12%) con accesso in PS per
aggressione ripetuta nei 24 mesi
successivi



Esito: Aggressione ripetuta Vs
Aggressione occasionale i
Metodo: Regressione Logistica

Aggressione ripetuta: Quali donne sono più vulnerabili?

Popolazione in studio N=4483

Caratteristiche	Aggressione		OR grezzo	IC95%	OR adj	IC95%
	Occasionale N = 3504	Ripetuta N = 979				
Stato civile (rif:coniugata)	1452	368	1.00		1.00	
Nubile	1526	463	1.20	1.03 - 1.40	0.96	0.79 - 1.17
Separata/Divorziata	358	116	1.28	1.01 - 1.62	1.36	1.07 - 1.73
Vedova	168	32	0.75	0.51 - 1.12	0.98	0.65 - 1.47
Età all'aggressione (rif: 55+ anni)	919	170	1.00		1.00	
15-24	402	110	1.48	1.13 - 1.93	1.57	1.14 - 2.17
25-34	521	189	1.96	1.55 - 2.48	2.07	1.56 - 2.74
35-44	863	307	1.92	1.56 - 2.37	1.96	1.57 - 2.46
45-54	799	203	1.37	1.10 - 1.72	1.34	1.06 - 1.69
SES (rif: Molto Alto)	518	113	1.00		1.00	
Medio Alto	569	147	1.18	0.90 - 1.56	1.18	0.89 - 1.55
Medio	659	187	1.30	1.00 - 1.69	1.28	0.98 - 1.66
Medio Basso	795	204	1.18	0.91 - 1.52	1.12	0.87 - 1.45
Basso	963	328	1.56	1.23 - 1.98	1.48	1.16 - 1.89

*Donne non
coniugate*

*Donne
giovani*

*Residenti in
Aree di
maggiore
deprivazione
economica*

Aggressione ripetuta: Quali donne sono più vulnerabili?

Donne in età 30+ anni N=2816

Caratteristiche	Aggressione		OR grezzo	IC95%	OR adj	IC95%
	Occasionale N = 2259	Ripetuta N = 557				
Stato civile (rif:coniugata)	1,308	300				
Nubile	447	121	1.18	0.93 - 1.50	1.10	0.86 - 1.40
Separata/Divorziata	338	104	1.34	1.04 - 1.73	1.41	1.09 - 1.83
Vedova	166	32	0.84	0.56 - 1.25	0.98	0.65 - 1.49
Età all'aggressione (rif: 55+ anni)	919	170				
35-44	541	184	1.84	1.46 - 2.32	1.98	1.52 - 2.56
45-54	799	203	1.37	1.10 - 1.72	1.45	1.13 - 1.84
Titolo di studio (rif:diploma)	880	197				
Nessun titolo/Elementare	369	82	0.99	0.75 - 1.32	1.28	0.93 - 1.77
Medie	674	195	1.29	1.04 - 1.61	1.30	1.03 - 1.64
Laurea	336	83	1.10	0.83 - 1.47	1.15	0.86 - 1.54
Indipendenza economica (rif:si)	1104	264				
No	1155	293	1.06	0.88 - 1.28	1.12	0.91 - 1.38

*Meno
istruite
e non
occupate*

Conclusioni

- ✓ L'analisi degli accessi in PS per aggressione può consentire di definire importanti eventi sentinella utili per identificare sospette vittime di violenza nel momento di accesso

- ✓ Tra le donne vittime di aggressione si evidenziano dei sottogruppi più vulnerabili alla violenza ripetuta

- ✓ Identificare una metodologia standard per la definizione della violenza attraverso le statistiche correnti permette di:
 - monitorare in modo continuo e sistematico il fenomeno ;
 - Raccogliere informazioni sui determinanti socio-demografici, e sul percorso di assistenza;
 - valutare gli esiti di salute

Grazie per l'attenzione

Conflitti di interesse da dichiarare: Nessuno